

Bestellen Sie jetzt!

10 % 20 % 30 %

Bezeichnung	Artikelnummer	Anzahl Pipetten	Listenpreis	Rabatt ab 1. Packung	Rabatt ab einem Felpreva®-Auftragswert von 200 €	Rabatt ab einem Felpreva®-Auftragswert von 600 €	Bestellmenge
Felpreva® für kleine Katzen (1 – 2,5 kg)	40123	2	42,25 €	38,03 €	33,80 €	29,58 €	
Felpreva® für kleine Katzen (1 – 2,5 kg)	40120	10	196,35 €	176,72 €	157,08 €	137,45 €	
Felpreva® für mittelgroße Katzen (> 2,5 – 5 kg)	40124	2	44,90 €	40,41 €	35,92 €	31,43 €	
Felpreva® für mittelgroße Katzen (> 2,5 – 5 kg)	40121	10	213,30 €	191,97 €	170,64 €	149,31 €	
Felpreva® für große Katzen (> 5 – 8 kg)	40125	2	52,95 €	47,66 €	42,36 €	37,07 €	
Felpreva® für große Katzen (> 5 – 8 kg)	40122	10	251,50 €	226,35 €	201,20 €	176,05 €	

*Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise in € und exkl. MwSt.
Diese Angebote richten sich nur an Tierärzte in Deutschland.*

Versandkostenfrei ab 50 €. Bei Rückfragen zu den Konditionen wenden Sie sich bitte an Ihren Gebietsmanager.

Gültig bis 31.05.2022



Kunden-Nummer _____

Ort / Datum _____

Unterschrift _____

Praxisstempel _____

Bestellungen an:
Fax (kostenfrei) 0800 - 14 00 6 00
Tel. (kostenfrei) 0800 - 63 63 100
germany_info@vetoquinol.com

*Bitte verwenden Sie bei Ihrer Bestellung (per Fax oder E-Mail) dieses Bestellformular.
Dieses Angebot gilt nicht bei Bestellungen über Heiland.com und WDT Marktplatz.
Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.*



Lieber Tierarzt, liebe Tierärztin,

endlich ist es so weit: **Felpreva®**, unser neues Endektozid, kann geliefert werden!

Speziell für Katzen entwickelt


93 % der Katzenbesitzer sagen, dass eine einfache Anwendung und ein möglichst breites Parasitenspektrum die wichtigsten Faktoren bei der Parasitenbekämpfung sind.¹

Einzige Kombination

Das neuartige **TIGOLANER** kombiniert mit dem bekannten Wirkstoffduo **EMODEPSID** und **PRAZIQUANTEL**.

Felpreva® – mehr als ein Katzensprung gegen Parasiten!

Ihr Felpreva® Team



Felpreva®

1. Vetoquinol market survey (SAPIO 2021)

Profender 30 mg/7,5 mg Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen. Profender 60 mg/15 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Katzen. Profender 96 mg/24 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen. Emodepsid/Praziquantel. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Wirkstoffe: Profender enthält 21,4 mg/ml Emodepsid und 85,8 mg/ml Praziquantel. Jede Einzeldosis (Pipette) von Profender enthält: Profender für kleine Katzen (> 0,5–2,5 kg): Volumen 0,35 ml; Emodepsid 7,5 mg; Praziquantel 30 mg. Profender für mittelgroße Katzen (> 2,5–5 kg): Volumen 0,70 ml; Emodepsid 15 mg; Praziquantel 60 mg. Profender für große Katzen (> 5–8 kg): Volumen 1,12 ml; Emodepsid 24 mg; Praziquantel 96 mg. Sonstige Bestandteile: 5,4 mg/ml Butylhydroxyanisol (E320; als Antioxidans). Anwendungsgebiete Für Katzen, bei denen eine parasitäre Mischinfektion vorliegt oder das Risiko einer parasitären Mischinfektion durch Rund-, Band- und Lungenwürmer der folgenden Arten besteht: Rundwürmer (Nematoden): Toxocara cati (unreife und reife adulte Stadien, L4, L3). Toxocara cati (L3-Larven) – für die Behandlung von Kätzinnen während der späten Trächtigkeit zur Verhinderung einer galaktogenen Übertragung auf die Welpen. Toxascaris leonina (unreife und reife adulte Stadien, L4). Ancylostoma tubaeforme (unreife und reife adulte Stadien, L4). Bandwürmer (Cestoden): Dipylidium caninum (unreife und reife adulte Stadien). Taenia taeniaeformis (adulte Stadien). Echinococcus multilocularis (adulte Stadien). Lungenwürmer: Aelurostrongylus abstrusus (adulte Stadien). Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Katzenwelpen, die jünger als 8 Wochen und leichter als 0,5 kg sind. Nebenwirkungen: In sehr seltenen Fällen können Speicheln und Erbrechen auftreten. In sehr seltenen Fällen können leichte und vorübergehende neurologische Erscheinungen wie Ataxie oder Tremor auftreten. Diese Reaktionen werden vermutlich durch das Ablecken der Applikationsstelle unmittelbar nach der Behandlung verursacht. In sehr seltenen Fällen kann nach Anwendung von Profender vorübergehender Haarausfall, Juckreiz und/oder eine entzündliche Reaktion an der Applikationsstelle auftreten. Wartezeit(en): Nicht zutreffend. DE: Verschreibungspflichtig. AT: Rezept- und apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber: Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure, Frankreich.

Felpreva Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen (1,0–2,5 kg)/mittelgroße Katzen (> 2,5–5,0 kg)/große Katzen (> 5,0–8,0 kg). QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG: Wirkstoffe: Jeder Tropfapplikator enthält: Felpreva für kleine Katzen (1,0–2,5 kg): Volumen der Einzeldosis: 0,37 ml; Tigolaner 36,22 mg; Emodepsid 7,53 mg; Praziquantel 30,12 mg. Felpreva für mittelgroße Katzen (> 2,5–5,0 kg): Volumen der Einzeldosis: 0,74 ml; Tigolaner 72,45 mg; Emodepsid 15,06 mg; Praziquantel 60,24 mg. Felpreva für große Katzen (> 5–8,0 kg): Volumen der Einzeldosis: 1,18 ml; Tigolaner 115,52 mg; Emodepsid 24,01 mg; Praziquantel 96,05 mg. Sonstige Bestandteile: 2,63 mg/ml Butylhydroxyanisol (E320) und 1,10 mg/ml Butylhydroxytoluol (E321) als Antioxidantien. Anwendungsgebiete: Für Katzen mit bestehenden parasitären Mischinfestationen /-infektionen oder bei Vorliegen eines entsprechenden Gefährdungspotentials. Das Tierarzneimittel ist ausschließlich für eine gleichzeitig auf Ektoparasiten, Cestoden und Nematoden gerichtete Therapie indiziert. Ektoparasiten: Zur Behandlung eines Floh- (Ctenocephalides felis) und Zeckenbefalls (Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus) bei Katzen mit sofortiger und anhaltender abtötender Wirkung über 13 Wochen. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie zur Kontrolle der allergischen Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung von leichten bis mittelschweren Fällen von Notoedres-Kopfräude (Notoedres cati). Zur Behandlung eines Ohrmilbenbefalls (Otodectes cynotis). Gastrointestinale Rundwürmer (Nematoden): Zur Behandlung von Infektionen mit: Toxocara cati (reife adulte, unreife adulte Stadien, L4 und L3); Toxascaris leonina (reife adulte, unreife adulte Stadien und L4); Ancylostoma tubaeforme (reife adulte, unreife adulte Stadien und L4). Lungenwürmer (Nematoden): Zur Behandlung von Infektionen mit: Aelurostrongylus abstrusus (adult); Troglodystrongylus brevior (adult). Bandwürmer (Cestoden): Zur Behandlung von Bandwurminfektionen: Dipylidium caninum (reife adulte und unreife adulte Stadien); Taenia taeniaeformis (adult). Gegenanzeigen: Nicht anwenden in Fällen von Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: In sehr seltenen Fällen können nach der Anwendung leichte und vorübergehende Reaktionen an der Applikationsstelle auftreten wie Kratzen, Erythem, Ausdünnen der Haare und/oder Entzündungen. Häufig werden kosmetische Effekte wie ein vorübergehendes Verkleben des Fells an der Auftragsstelle beobachtet. In sehr seltenen Fällen können leichte und vorübergehende Verdauungsstörungen wie übermäßiger Speichelfluss oder Erbrechen auftreten. Es wird angenommen, dass die Wirkungen auftreten, wenn die Katze die Applikationsstelle unmittelbar nach der Behandlung ableckt. In Einzelfällen können diese Anzeichen von unspezifischen Symptomen wie Erregung, Lautäußerungen oder Appetitmangel begleitet sein. Wartezeit(en): Nicht zutreffend. DE: Verschreibungspflichtig. AT: Rezept- und apothekenpflichtig. ZULASSUNGSINHABER: Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure, Frankreich.

