

Clavaseptin 50 mg Tabletten für Hunde und Katzen

Clavaseptin 62,5 mg Tabletten für Hunde und Katzen

Clavaseptin 250 mg Tabletten für Hunde

Clavaseptin 500 mg Tabletten für Hunde

Clavaseptin 750 mg Tabletten für Hunde.

QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG:

Jede Tablette enthält:

	Clavaseptin 50 mg	Clavaseptin 62,5 mg	Clavaseptin 250 mg	Clavaseptin 500 mg	Clavaseptin 750 mg
<u>Wirkstoffe:</u>					
Amoxicillin (als Amoxicillin- Trihydrat)	40 mg	50 mg	200 mg	400 mg	600 mg
Clavulansäure (als Kaliumclavulanat)	10 mg	12,5 mg	50 mg	100 mg	150 mg
<u>Sonstige Bestandteile:</u>					
Eisen(III)-oxid (E172)	0,095 mg	0,120 mg	0,475 mg	0,950 mg	1,43 mg

Crospovidon, Covidon K25, Siliciumdioxid, Mikrokristalline Cellulose, Schweineleberaroma, Trockenhefe aus *Saccharomyces cerevisiae*, Magnesiumstearat, Hypromellose

ANWENDUNGSGEBIETE FÜR JEDE ZIELTIERART:

Bei Hunden: Zur Behandlung von Infektionen hervorgerufen durch Amoxicillin-empfindliche Bakterien in Kombination mit Clavulansäure (einschließlich Beta-Laktamase-produzierender Stämme), insbesondere:

- Hautinfektionen (einschließlich tiefer und oberflächlicher Pyodermien, Wunden, Abszesse), hervorgerufen durch *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. und *Pasteurella* spp.
- Atemwegsinfektionen (Sinusitis, Rhino-Tracheitis, Bronchopneumonie), hervorgerufen durch *Staphylococcus* spp. und *E. coli*.
- Infektionen der Maulhöhle (Schleimhäute), hervorgerufen durch *Streptococcus* spp. und *Pasteurella* spp.
- Harnwegsinfektionen (Nephritis, Zystitis), hervorgerufen durch *E. coli*, *Klebsiella* spp. und *Proteus mirabilis*.
- Infektionen des Verdauungstrakts, insbesondere Gastroenteritis, hervorgerufen durch *E. coli*.

Bei Katzen: Zur Behandlung von Infektionen hervorgerufen durch Amoxicillin-empfindliche Bakterien in Kombination mit Clavulansäure (einschließlich Beta-Laktamase-produzierender Stämme), insbesondere:

- Hautinfektionen (einschließlich tiefer und oberflächlicher Pyodermien, Wunden, Abszesse), hervorgerufen durch *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. und *Pasteurella* spp.
- Atemwegsinfektionen (Sinusitis, Rhino-Tracheitis, Bronchopneumonie), hervorgerufen durch *Staphylococcus* spp. und *E. coli*.
- Infektionen der Maulhöhle (Schleimhäute), hervorgerufen durch *Streptococcus* spp. und *Pasteurella* spp.
- Harnwegsinfektionen (Nephritis, Zystitis), hervorgerufen durch *E. coli*, *Pasteurella* spp., *Klebsiella* spp. und *Proteus mirabilis*.
- Infektionen des Verdauungstrakts, insbesondere Gastroenteritis, hervorgerufen durch *E. coli*.



GEGENANZEIGEN:

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Penicilline oder andere Substanzen der Beta-Laktam-Gruppe oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei Wüstenrennmäusen, Meerschweinchen, Hamstern, Kaninchen und Chinchillas oder anderen kleinen Pflanzenfressern. Nicht anwenden bei Tieren mit schweren Nierenfunktionsstörungen in Verbindung mit Anurie oder Oligurie. Nicht anwenden bei Pferden und Wiederkäuern.

NEBENWIRKUNGEN:

Sehr selten (< 1 Tier/10 000 behandelte Tiere, einschließlich Einzelfallberichte):	Erbrechen ¹ , Durchfall ¹ Überempfindlichkeitsreaktion (allergische Hautreaktion ²), Anaphylaxie ²
--	--

¹) Abhängig von der Schwere der Nebenwirkungen und einer Nutzen-Risiko-Bewertung durch den Tierarzt kann die Behandlung abgebrochen werden.

²) In diesen Fällen sollte die Anwendung abgebrochen und eine symptomatische Behandlung eingeleitet werden.

BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH:

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten.

ZULASSUNGSINHABER:

DE: Vetoquinol GmbH, Reichenbachstr. 1, D-85737 Ismaning.

AT: Vetoquinol Österreich GmbH, Gußhausstr. 14/5, A-1040 Wien.